

# CORRECTOR

**CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI  
COMPLESSO DI CALCIO CON LIGNINSOLFONATO DI AMMONIO**



## Caratteristiche generali

CORRECTOR, soluzione di concime a base di complesso di Calcio con acido lignosolfonico, è un concime specificatamente studiato per la nutrizione tecnica dei tappeti erbosi; controlla le più fastidiose fisiopatie legate alle disfunzioni del Calcio. Non presenta fitotossicità ed è tra le forme più immediate nel rilascio nelle piante capaci d'innalzare il livello di Calcio. Colore marrone. Risulta particolarmente gentile sulle foglie, senza ustioni e bruciature, pur avendo un'efficacia eccezionale. CORRECTOR presenta un grado di complessazione superiore addirittura al 93%.

La parte non assorbita dalle foglie penetra nel terreno e non viene dilavata grazie alla sua speciale formulazione, rimanendo così a disposizione per i vegetali. Dona un forte irrobustimento delle pareti cellulari, rendendo l'erba più dura, "crocante", e meno sensibile ai traumi da calpestio; per questo motivo è bene considerare il suo impiego sempre prima dei rigori invernali per proteggere le piante anche dai danni da freddo e da traffico. Il suo pH pari a 5,8 lo rende anche una soluzione acida/sub-acida con aiuto nel controllo indiretto delle principali fisiopatie.

La scelta delle materie prime costituenti, altamente pure e cristalline, permette una sua distribuzione facile ed immediata con pressoché ogni tipo di acqua (anche quelle dure) senza alcun problema d'intasamento degli ugelli, mantenendo valori di stabilità della forma chelata anche a range di pH compresi tra 4 e 8. Non produce incrostazioni. Può essere assorbito sia per via fogliare e sia per via radicale. La sua durata (variabile a seconda delle dosi e della tipologia d'impiego) dura generalmente da 2 a massimo 4 settimane.

## Composizione

### MESOELEMENTI

**Calcio**

**15,0% CaO totale  
14% CaO chelato con LPCA**

## Consigli pratici per l'uso

Applicare CORRECTOR in caso di accertata mancanza di Calcio e/o prima degli stress biotici ed abiotici. È bene distribuire il prodotto su foglia asciutta.

Dose per fertirrigazione: 0,5-1 g/m<sup>2</sup> in fertirrigazione (assorbimento radicale), vale a dire 1 flacone/1000-2000 m<sup>2</sup> oppure 1 tanica/5000-10000 m<sup>2</sup>

Dose per trattamenti aerei: 0,15-0,3 g/m<sup>2</sup> per trattamenti aerei (assorbimento fogliare), vale a dire 1 flacone/3300-6500 m<sup>2</sup> oppure 1 tanica 16500-33000 m<sup>2</sup>

## Periodo di distribuzione



**PESO CONFEZIONE:** taniche da 5 Kg - flaconi da 1 Kg

**CARTONI:** 4 taniche - 20 flaconi



**EMERALD**